
GUIA DE VARIEDADES

2026/2027

SoyTech®

BASF Soluções para Agricultura.
Juntos pelo seu Legado.

 **BASF**
We create chemistry



A SUA PRÓXIMA GERAÇÃO DE **RESULTADOS** ESTÁ AQUI.



Na **SoyTech®**, cada semente é resultado de ciência, tecnologia e compromisso com quem produz. Somos a marca de licenciamento de sementes de soja da BASF, criada para entregar genética de alta performance, potencializando a produtividade no campo e transformando cada cultivar em resultado real. Porque acreditamos que, ao lado de quem multiplica, distribui e planta, nasce **sua próxima geração de resultados**.



ÍNDICE

CENTRO-NORTE 6

Lançamento 7

ST 745 I2X 7

ST 807 I2X 8

ST 828 I2X 9

Intacta 2 Xtend 10

ST 616 I2X 10

ST 641 I2X 11

ST 711 I2X 12

ST 752 I2X 13

ST 822 I2X 14

Intacta RR2 PRO 15

BS 2606 IPRO 15

ST 622 IPRO 16

Prática de Refúgio 18

Mapa de Recomendação 20



REGIÃO

CENTRO-NORTE

ST 745

LANÇAMENTO

I2X

BSA74483I2X

SoyTech®

7.4

Grupo de maturação

170g

Peso de mil grãos

- TOLERANTE AO ACAMAMENTO
- AMPLA ADAPTAÇÃO GEOGRÁFICA
- PERMITE ABERTURA DE PLANTIO

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado

PUBESCÊNCIA: Cinza

FLOR: Roxa

HILO: Marrom Claro

REAÇÃO A DOENÇAS	R	MR
Nematoide de Cisto Raça: 3		
Nematoide de Cisto Raças: 6, 10 e 14		
Nematoide de Galha		
Podridão R. de Fitóftora		
Cancro da Haste		
Necrose da Haste		
Mancha Alvo		
Mancha Olho-de-Rã		
Pústula Bacteriana		
Ferrugem Asiática		

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 32	SET		OUT			NOV			DEZ
			11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	1-10
301	Chapadões	18			280-300	260-280	260-280	260-280	260-280	280-300	320-380
304/ 401	Sudoeste GO	19		300-320	300-320	260-300	260-300	260-300	260-300	280-320	300-360
302/ 303	Pontal Sul GO	20		300-320	280-300	260-300	260-300	260-300	260-300	280-300	300-360
303	Triangulo MG	22			260-300	260-300	260-300	260-300	260-300	280-300	320-380
304	GO / MG	24				300-340	280-320	280-320	280-320	280-320	320-380
304	GO / MG (Irrigado)	24		260-300	260-300	240-280	240-280	240-280	240-280	260-300	360-420
401	MT Sul	25		320-340	300-340	280-300	280-300	280-300	280-300	320-340	300-360
401	Grande Primavera	26		320-340	300-340	280-320	280-320	280-300	280-300	320-340	300-360
402	Parecis	27	340-360	320-340	320-340	320-340	320-340	320-340	320-340		
402	BR 163	28	340-360	320-340	320-340	320-340	320-340	320-340			
402	Rondônia	29			300-320	280-300	280-300	280-300	300-360		
403	Vale do Araguaia	30			320-360	320-340	320-340	300-340	300-340	300-360	340-400
404	Norte GO	31				300-340	300-340	300-340	300-340	300-340	

*Levar em consideração todas as janelas de vazío sanitário da sua região.

Recomendado Tolerado



INTACTA2

XTEND

BASF

We create chemistry

ST 807 I2X

LANÇAMENTO

BSA80777I2X

SoyTech®

8.0

Grupo de maturação

209g

Peso de mil grãos

 ELEVADO PESO DE GRÃOS

 ALTO POTENCIAL PRODUTIVO

 SISTEMA RADICULAR AGRESSIVO

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado

PUBESCÊNCIA: Cinza

FLOR: Branca

HILO: Marrom Claro

REAÇÃO A DOENÇAS

	R	MR
Nematoide de Cisto Raça: 3 e 10	●	○
Nematoide de Cisto Raças: 6 e 14	○	●
Nematoide de Galha	○	○
Podridão R. de Fitóftora	●	○
Cancro da Haste	●	○
Necrose da Haste	●	○
Mancha Alvo	○	○
Mancha Olho-de-Rã	○	○
Pústula Bacteriana	○	○
Ferrugem Asiática	○	○

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 32	SET	OUT			NOV		
			21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30
401	MT Sul	25	220-240	200-220	200-220	200-220	260-320		
401	Grande Primavera	26	220-240	200-220	200-220	200-220	260-320		
402	Parecis	27	220-250	220-240	220-240	220-240	220-240	260-320	
402	BR163	28	220-250	220-240	220-240	220-240	220-240	260-340	
403	Vale do Araguaia	30		240-280	240-280	240-280	240-280	260-340	260-340

*Levar em consideração todas as janelas de vazío sanitário da sua região.

● Recomendado ■ Tolerado



INTACTA2[®]
XTEND

BASF
We create chemistry

ST 828 I2X

BSA82524I2X

LANÇAMENTO

SoyTech®

8.2 Grupo de maturação

170g Peso de mil grãos

ALTO POTENCIAL PRODUTIVO

AMPLA ADAPTAÇÃO GEOGRÁFICA

ÓTIMA ARQUITETURA DE PLANTA

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado

PUBESCÊNCIA: Cinza

FLOR: Branca

HILO: Marrom Claro

REAÇÃO A DOENÇAS	R	MR
Nematoide de Cisto	☐	☐
Nematoide de Galha	☐	☐
Podridão R. de Fitóftora	☐	☒
Cancro da Haste	☒	☐
Necrose da Haste	☒	☐
Mancha Alvo	☐	☐
Mancha Olho-de-Rã	☒	☐
Pústula Bacteriana	☒	☐
Ferrugem Asiática	☐	☐

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 32	SET	OUT			NOV			DEZ
			21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	1-10
402	Parecis	27	210-230	200-220	200-220	200-220	200-220	230-250		
402	BR163	28	210-230	200-220	200-220	200-220	200-220	230-250		
403	Vale do Araguaia	30			240-260	230-250	230-250	230-250	230-250	260-360
404	Norte GO	31				240-260	230-250	230-250	230-250	240-260
405	Bahia	34				230-250	210-220	210-220	210-220	230-270
501	Norte TO / Sul PA	33				240-260	230-250	230-250	230-250	240-320
501	MA / PI	35				240-260	230-250	230-250	230-250	240-320

*Levar em consideração todas as janelas de vazios sanitário da sua região.

Recomendado Tolerado



INTACTA2XTEND

BASF
We create chemistry

ST 616 I2X

SoyTech®

6.1 Grupo de maturação

167g Peso de mil grãos

ALTO POTENCIAL PRODUTIVO

AMPLA ADAPTAÇÃO GEOGRÁFICA

ESTABILIDADE PRODUTIVA

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado

PUBESCÊNCIA: Cinza

FLOR: Roxa

HILO: Preto Imperfeito

REAÇÃO A DOENÇAS

	R	MR
Nematoide de Cisto	☐	☐
Nematoide de Galha	☐	☐
Podridão R. de Fitóftora (Rps1k) Raças: 1, 3, 4, 7 e 17	☒	☐
Cancro da Haste	☒	☐
Necrose da Haste	☒	☐
Mancha Alvo	☐	☐
Mancha Olho-de-Rã	☐	☐
Pústula Bacteriana	☐	☐
Ferrugem Asiática	☐	☐

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 32	SET			OUT			NOV			DEZ		
			01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30
101	Coxilha	01					220-240	220-240	220-240	220-260	240-260	260-280	280-320	
101	Várzea	01							220-240	220-260	260-300	280-300	280-340	300-360
102	RS / SC (<400m)	02					240-260	240-260	230-250	230-250	230-250	250-270		
102	RS / SC (>650m) e PR (>500m)	04				250-270	230-250	230-250	230-250	230-250	250-270			
102	RS / SC Transição (>400<650m)	03					220-240	220-240	220-240	230-250	230-250	230-250		
102	Sudoeste PR	05			240-260	220-240	220-240	220-240	220-240	240-260				
103	Campos Gerais (>750m)	06				220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	240-300			
103	Campos Gerais (<750m)	07				220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-300	220-340		
103	Sudoeste SP	08		240-260	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	240-300			
104	Litoral SC	09					200-220	200-220	220-240	220-240	220-240	240-260	260-280	
201	Beira Lago	10	260-280	240-260	220-260	200-260	200-260	200-260	240-260					
201	Transição PR	11	240-260	240-260	220-260	180-260	180-260	180-260	200-260					
201/ 203	Norte PR / Sul SP	12			220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	220-320				
202	Arenito	13			220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	220-280				
204	Grande Dourados	14			220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	220-280				
204	Fronteira	15			220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	220-340				
204	Serra	16			220-280	220-280	220-280	220-280	220-280	220-280				
302	SP Baixa Altitude	21					220-240	220-240	220-240	220-240	220-320			
303	Sul de Minas	23					220-240	220-240	220-240	220-240	240-300			
405	Bahia	34				380-420	380-420							

*Levar em consideração todas as janelas de vazios sanitário da sua região.

Recomendado Tolerado



INTACTA2XTEND

BASF We create chemistry

ST 641 I2X

SoyTech®

6.4 Grupo de
maturação176g
Peso de
mil grãos

ALTO POTENCIAL PRODUTIVO

SISTEMA RADICULAR AGRESSIVO

EXCELENTE POTENCIAL DE ENGALHAMENTO

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado

PUBESCÊNCIA: Cinza

FLOR: Roxa

HILO: Preto Imperfeito

REAÇÃO A DOENÇAS

	R	MR
Nematoide de Cisto	☐	☐
Nematoide de Galha	☐	☐
Podridão R. de Fitóftora (Rps1k) Raças: 1, 3, 4, 7 e 17	☒	☐
Cancro da Haste <i>D. aspalathi</i>	☒	☐
Necrose da Haste	☒	☐
Mancha Alvo	☐	☐
Mancha Olho-de-Rã	☐	☒
Pústula Bacteriana	☒	☐
Ferrugem Asiática	☐	☐

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 32	SET	OUT			NOV		
			21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30
201 / 203	Norte PR / Sul SP	12	200-240	200-240	200-240	200-240	200-240	200-300	
204	Grande Dourados	14	200-240	200-240	200-240	200-240	200-240	200-240	
202	Arenito	13	200-240	200-240	200-240	200-240	200-240	200-240	200-330
204	Fronteira	15	200-240	200-240	200-240	200-240	200-240	200-300	
204	Serra	18	200-240	200-240	200-240	200-240	200-240	200-240	
301	Chapadões	18		330-350	310-330	310-330	310-330	310-330	330-390
301	MS Norte	17		330-350	310-330	310-330	310-330	310-330	310-390
301 / 401	Sudoeste GO	19		330-370	330-350	330-350	330-350	330-350	330-400
303	Triângulo MG	22		290-310	270-300	270-300	270-300	270-300	270-350
302 / 303	Pontal MG / Sul GO	20		350-370	330-350	330-350	330-350	330-350	350-400
302	SP Baixa Altitude	21		280-300	250-270	250-270	250-270	250-270	250-340
304	GO / MG	24			360-400	340-360	340-360	340-360	340-440
304	GO / MG (Irrigado)	24	330-350	330-350	330-350	330-350	320-340	320-340	320-340
404	Norte GO	31			380-400	360-380	360-380	360-380	360-440

*Levar em consideração todas as janelas de vazios sanitário da sua região.

Recomendado Tolerado

INTACTA2
XTENDBASF
We create chemistry

ST 711 I2X

SoyTech®

7.1 Grupo de maturação

172g Peso de mil grãos

Roxa

MULTIRRESISTENTE À NEMATOIDE DE CISTO



AMPLA ADAPTAÇÃO GEOGRÁFICA



TOLERANTE AO ACAMAMENTO

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado

PUBESCÊNCIA: Cinza

FLOR: Roxa

HILO: Preto Imperfeito

REAÇÃO A DOENÇAS

R MR

Nematoide de Cisto Raça: 3

☒ ☐

Nematoide de Cisto Raças: 9, 10 e 14

☐ ☒

Nematoide de Galha

☐ ☐

Podridão R. de Fitóftora

☐ ☒

Cancro da Haste

☒ ☐

Necrose da Haste

☒ ☐

Mancha Alvo

☐ ☐

Mancha Olho-de-Rã

☒ ☐

Pústula Bacteriana

☐ ☐

Ferrugem Asiática

☐ ☐

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 32	SET		OUT			NOV		
			11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30
301	Chapadões	18			280-320	280-300	280-300	280-300	280-300	
301	MS Norte	17			280-320	280-300	280-300	280-300	280-300	280-340
301 / 401	Sudoeste GO	19			300-340	280-320	280-320	280-320	280-320	300-380
302	SP Baixa Altitude	21				240-280	240-280	240-280	240-340	260-360
302 / 303	Pontal MG / Sul GO	20		300-340	280-320	280-320	280-320	280-320	280-380	300-380
303	Sul de Minas	23			220-260	220-260	220-260	220-260	220-260	
303	Triangulo MG / Sudeste GO	22			280-300	260-280	260-280	260-280	260-280	
304	GO / MG	24				260-300	260-300	260-300	260-300	
404	Norte GO	31				280-320	280-320	280-320	280-320	300-380
401	Grande Primavera	26	340-360	320-360	320-340	300-320	300-320	300-320	300-320	
401	MT Sul	25	340-360	320-340	300-320	300-320	300-320	300-320	300-400	
402	BR 163	28	360-380	340-360	340-360	320-340	320-340	320-340	340-360	
402	Parecis	27	360-380	340-360	320-360	320-340	320-340	320-340	320-420	
402	Rondônia	29			280-300	280-300	280-300	280-300	280-380	
403	Vale do Araguaia	30			380-400	360-400	360-380	360-380	360-380	360-380
405	Bahia	34			380-400	380-400	380-400	380-400		

*Levar em consideração todas as janelas de vazio sanitário da sua região.

 Recomendado Tolerado

INTACTA2XTEND

BASF
We create chemistry

ST 752 I2X

7.5 Grupo de maturação

204g Peso de mil grãos

- ESTABILIDADE PRODUTIVA
- ELEVADO PESO DE GRÃOS
- MULTIRRESISTENTE À NEMATOIDE DE CISTO

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado

PUBESCÊNCIA: Cinza

FLOR: Roxa

HILO: Preto Imperfeito

REAÇÃO A DOENÇAS	R	MR
Nematoide de Cisto Raça: 3 e 14	●	○
Nematoide de Cisto Raças: 6 e 9	○	●
Nematoide de Galha	○	○
Podridão R. de Fitóftora	○	●
Cancro da Haste <i>D. aspalathi</i>	●	○
Necrose da Haste	●	○
Mancha Alvo	○	○
Mancha Olho-de-Rã	●	○
Pústula Bacteriana	○	○
Ferrugem Asiática	○	○

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 32	SET		OUT			NOV			DEZ			JAN	
			11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20
301 / 401	Sudoeste GO	19		240-260	240-260	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240					
301	Chapadões	18			220-240	200-220	200-220	200-220	200-220	200-220					
301	MS Norte	17		220-240	220-240	200-220	200-220	200-220	200-220	200-220					
302 / 303	Pontal MG / Sul GO	20			240-260	220-240	220-240	220-240	220-240						
303	Triângulo MG / Sudeste GO	22			200-220	200-220	200-220	200-220	200-220						
302	SP Baixa Altitude	21				180-200	180-200	180-200	180-200	220-370					
304	GO / MG	24				200-240	200-240	200-240	200-240	200-370					
304	GO / MG (irrigado)	24		200-240	180-220	180-220	180-220	180-220	180-220	200-220					
404	Norte GO	31				220-260	220-260	220-260	220-260	220-380					
401	Grande Primavera	26	300-320	300-320	260-280	240-280	240-280	240-280	280-380						
401	MT Sul	25	300-320	300-320	260-280	240-280	240-280	240-280	280-380						
402	BR 163	28	300-320	300-320	260-300	260-300	260-300	260-300	280-380						
402	Parecis	27	300-320	300-320	260-300	260-300	260-300	260-300	280-380						
402	Rondônia	29			240-260	240-260	240-260	240-260	240-300	280-420					
403	Vale do Araguaia	30			340-360	300-320	300-320	300-320	300-320	300-380					
405	Bahia	34			280-320	280-320	280-320	280-320	280-320	300-420					
501	MA / PI	35			300-340	300-340	300-340	300-340	300-340	300-400					
404	TO Sul	32				300-360	300-360	300-360	300-360						
501	Norte TO / Sul PA	33				340-400	340-400	340-400	340-400						
502	Norte PA / MA	36									300-340	300-340	300-340	300-340	300-340

*Levar em consideração todas as janelas de vazio sanitário da sua região.

Recomendado Tolerado



BASF
We create chemistry

ST 822 I2X

8.2

Grupo de maturação

195g

Peso de mil grãos

- EXCELENTE POTENCIAL DE ENGALHAMENTO
- PERMITE ABERTURA DE PLANTIO
- SISTEMA RADICULAR AGRESSIVO

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado

PUBESCÊNCIA: Cinza

FLOR: Roxa

HILO: Preto Imperfeito

REAÇÃO A DOENÇAS	R	MR
Nematoide de Cisto	☐	☐
Nematoide de Galha	☐	☐
Podridão R. de Fitóftora	☐	☐
Cancro da Haste <i>D. aspalathi</i>	☒	☐
Necrose da Haste	☒	☐
Mancha Alvo	☐	☐
Mancha Olho-de-Rã	☐	☒
Pústula Bacteriana	☒	☐
Ferrugem Asiática	☐	☐

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 32	SET		OUT			NOV			DEZ			JAN	
			11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20
301	MS Norte	17			180-200	180-200	180-200	180-200	180-200	180-280					
304	GO / MG	24			200-240	180-220	180-220	180-220	180-220	180-280					
401	MT Sul	25	220-240	220-240	200-220	200-220	200-220	200-300							
401	Grande Primavera	26	220-240	200-240	200-240	200-240	200-240	200-300							
402	BR163	28	240-260	240-260	220-240	220-240	220-240	220-320							
402	Parecis	27	240-260	240-260	220-240	220-240	220-240	220-320							
402	Rondonia	29			200-220	180-200	180-200	180-200	180-330						
403	Vale do Araguaia	30			240-280	220-260	220-260	220-260	220-260	220-260					
404	Norte GO	31			220-260	200-240	200-240	200-240	200-240	200-280					
404	TO Sul	32			240-260	240-260	240-260	240-260	240-260	240-340					
405	Bahia	34			200-240	200-240	200-240	200-240	200-240	200-320					
501	Norte TO / Sul PA	33			240-260	240-260	240-260	240-260	240-260	240-340					
501	MA / PI	35				240-260	240-260	240-260	240-260	240-340					
502	Norte PA / MA	36				240-260	240-260	240-260	240-260	240-340	240-260	240-260	240-260	240-260	240-340
301/ 401	Sudoeste GO	19			180-220	180-220	180-220	180-220	180-220	180-280					

*Levar em consideração todas as janelas de vazio sanitário da sua região.

Recomendado

Tolerado



BS 2606 IPRO

SoyTech®

6.0 Grupo de maturação

173g Peso de mil grãos



SISTEMA RADICULAR AGRESSIVO



EXCELENTE POTENCIAL DE ENGALHAMENTO



AMPLA ADAPTAÇÃO GEOGRÁFICA

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado

PUBESCÊNCIA: Cinza

FLOR: Roxa

HILO: Preto Imperfeito

REAÇÃO A DOENÇAS

	R	MR
Nematoide de Cisto	☐	☐
Nematoide de Galha	☐	☐
Podridão R. de Fitóftora (Rps1c) Raças: 1, 3, 7 e 17	☒	☐
Cancro da Haste <i>D. aspalathi</i>	☐	☒
Necrose da Haste	☒	☐
Mancha Alvo	☐	☐
Mancha Olho-de-Rã	☐	☒
Pústula Bacteriana	☒	☐
Ferrugem Asiática	☐	☐

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 32	SET		OUT			NOV		
			11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30
101	Coxilha	01				260-280	240-260	240-260	240-260	240-260
102	RS / SC (<400m)	02			280-300	260-280	260-280	220-240	220-240	280-300
102	RS / SC (>650m) e PR (>500m)	04		260-280	240-260	220-240	200-220	200-220	220-240	240-260
102	RS / SC Transição (>400 <650m)	03			260-280	240-260	220-240	220-240	240-260	260-280
102	Sudoeste PR	05		280-300	240-260	220-240	200-220	200-220	200-220	240-260
103	Campos Gerais < 750m	07			260-280	240-260	220-240	220-240	220-240	240-260
103	Campos Gerais (>750m), Planalto Catarinense e Campos de Cima da Serra RS	06			240-260	240-260	200-220	200-220	200-220	240-260
201	Beira Lago	10	280-300	260-280	260-280	220-240	220-240			
201	Transição PR	11	260-280	240-260	240-260	200-220	200-220	200-220		
202	Arenito	13		280-300	260-280	260-280	260-280	260-280	260-280	
204	Fronteira	15		260-280	240-260	240-260	240-260	240-260		
204	Grande Dourados	14		280-300	260-280	260-280	260-280	260-280		
204	Serra	16		280-300	260-280	260-280	260-280	260-280	260-280	
201 / 203	Norte PR / Sul SP	12		260-280	240-260	240-260	240-260	240-260	240-260	260-280
301	Chapadões	18			400-420	380-400	380-400	380-400	380-400	
302	SP Baixa Altitude	21			380-400	360-380	360-380	360-380	360-380	380-400
303	Triângulo MG	22			400-420	380-400	380-400	380-400	380-400	400-420
304	GO / MG	24			400-420	380-400	380-400	380-400	380-400	400-420
301 / 401	Sudoeste GO	19			400-420	380-400	380-400	380-400	380-400	400-420
302 / 303	Pontal Sul GO	20			400-420	380-400	380-400	380-400	380-400	400-420

*Levar em consideração todas as janelas de vazio sanitário da sua região.

■ Recomendado ■ Tolerado



INTACTA RR2 PRO®

BASF
We create chemistry

ST 622 IPRO

SoyTech®

6.2 Grupo de maturação

173g Peso de mil grãos

ALTO POTENCIAL PRODUTIVO

AMPLA ADAPTAÇÃO GEOGRÁFICA

TOLERANTE AO ACAMAMENTO

HÁBITO DE CRESCIMENTO: Indeterminado

PUBESCÊNCIA: Cinza

FLOR: Roxa

HILO: Preto Imperfeito

REAÇÃO A DOENÇAS

	R	MR
Nematoide de Cisto	☐	☐
Nematoide de Galha	☐	☐
Podridão R. de Fitóftora	☐	☒
Cancro da Haste <i>D. aspalathi</i>	☒	☐
Necrose da Haste	☒	☐
Mancha Alvo	☐	☐
Mancha Olho-de-Rã	☐	☐
Pústula Bacteriana	☐	☐
Ferrugem Asiática	☐	☐

POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

REC	REGIÃO	REF.MAPA PG. 32	SET		OUT			NOV			DEZ	
			11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20
101	Várzea	01						280-300	280-300	280-300	300-320	320-360
101	Coxilha	01					280-300	280-300	280-300	280-300	300-320	320-360
102	RS / SC Transição (Entre 400 e 650m)	03					240-260	240-260	240-260	240-260	260-280	260-280
102	RS / SC (<400m)	02					280-320	260-280	260-280	260-280	280-320	
102	Sudoeste PR	05	260-280	260-280	260-280	220-240	220-240					
103	Campos gerais (>750m), Planalto Catarinense e Campos de Cima da Serra RS	06		260-300	240-260	220-240	220-240	220-240	220-240	260-280	260-300	
103	Campos Gerais (<750m)	07		260-300	240-260	220-240	220-240	220-240	220-240	260-280	260-300	
103	Sudoeste SP	08	280-320	220-240	240-260	220-240	220-240	240-260	240-260			
104	Litoral SC	09						260-280	260-280	260-280	260-280	280-320
201	Beira Lago	10		260-300	240-260	240-260	240-260	260-300				
201	Transição PR (<600m)	11		260-300	240-260	240-260	240-260	260-300				
201	Transição PR (>600m)	11		240-260	220-240	220-240	220-240	240-260				
201 / 203	Norte PR / Sul SP (<500m)	12		260-300	240-260	240-260	240-260	240-260	240-260			
201 / 203	Norte PR / Sul SP (>500m)	12			220-240	220-240	220-240	220-240	220-240			
202	Arenito (PR)	13			260-300	260-280	260-280	260-280	260-300			
202	Arenito (MS)	13			280-320	260-280	240-260	240-260	260-300			
204	Grande Dourados	14			260-300	260-280	240-260	240-260	260-300			
204	Fronteira	15		280-320	260-280	240-260	240-260	240-260	260-300			
204	Serra	16		280-320	260-280	260-280	260-280	260-280	260-300			
302	SP Baixa Altitude	21			270-310	250-270	250-270	250-270	250-270			
303	Triângulo MG / Sudeste GO	22			350-390	330-350	330-350	330-350	350-390			
304	GO / MG	24			400-440	380-300	330-300	360-380	360-380	360-380		

*Levar em consideração todas as janelas de vazio sanitário da sua região.

Recomendado Tolerado



INTACTA RR2 PRO®

BASF
We create chemistry



EXEMPLIFICAÇÃO DA PRÁTICA DE REFÚGIO

SoyTech®


O QUE É O REFÚGIO?

Soja BT: é a soja que teve seu código geneticamente modificado, recebendo proteína BT.

A soja não BT: é a variedade que não possui a proteína BT.


Serve para gerar indivíduos suscetíveis às proteínas BT > elas poderão cruzar com indivíduos sobreviventes do talhão com soja Bt e assim preservar a biotecnologia.

Para que o refúgio seja efetivo, as sementes BT devem ser plantadas em 80% da área total de soja e 20% de sementes não BT, respeitando uma distância máxima de 800 metros das áreas com soja INTACTA. Essa prática auxilia em retardar a multiplicação de insetos resistentes à tecnologia.




BLOCO OU PIVÔ CENTRAL DE IRRIGAÇÃO

Pivô central onde 20% foram semeados com cultivar não BT e o restante com cultivar BT.



BORDADURA OU PERÍMETRO

Na bordadura da lavoura, foi realizada a semeadura com cultivar não BT, respeitando o mínimo de 20% da propriedade. E no centro temos uma cultivar com BT, respeitando o mínimo orientado de 80%.



TALHÃO

Nos dois talhões mais escuros foi realizada semeadura com cultivar não BT. Já nos demais talhões, em cinza claro, a semeadura foi feita com cultivares IPRO e I2X, ambas com presença de BT.

ÁREA NÃO BT


ÁREA BT



MAPA DE RECOMENDAÇÃO

REC	REGIÃO	Nº
101	Coxilha	01
101	Várzea	01
102	RS / SC (<400m)	02
102	RS / SC Transição (Entre 400 e 650m)	03
102	RS / SC (>650m) e PR (>500m)	04
102	Sudoeste PR	05
103	Campos Gerais (>750m), Planalto Catarinense e Campos de Cima da serra RS	06
103	Campos Gerais (<750m)	07
103	Sudoeste SP	08
104	Litoral SC	09
201	Beira Lago	10
201	Transição PR	11
201 / 203	Norte PR / Sul SP	12
202	Arenito	13
204	Grande Dourados	14
204	Fronteira	15
204	Serra	16
301	MS Norte	17
301	Chapadões	18
301 / 401	Sudoeste GO	19
302 / 303	Pontal MG / Sul GO	20
302	SP Baixa Altitude	21

303	Triângulo MG /Sudeste GO	22
303	Sul de Minas	23
304	GO / MG	24
401	MT Sul	25
401	Grande Primavera	26
402	Parecis	27
402	BR 163	28
402	Rondônia	29
403	Vale do Araguaia	30
404	Norte GO	31
404	TO Sul	32
501	Norte TO / Sul PA	33
405	Bahia	34
501	MA / PI	35
502	Norte PA / MA	36



SoyTech®

SUA PRÓXIMA GERAÇÃO
DE **RESULTADOS**

BASF Soluções para Agricultura.
Juntos pelo seu Legado.

 **BASF**
We create chemistry