# GUIA DE VARIEDADES 2026/2027

# SoyTech®

BASF Soluções para Agricultura.
Juntos pelo seu Legado.

BASF
We create chemistry

# A SUA PRÓXIMA GERAÇÃO DE **RESULTADOS** ESTÁ AQUI.

Na **SoyTech®**, cada semente é resultado de ciência, tecnologia e compromisso com quem produz. Somos a marca de licenciamento de sementes de soja da BASF, criada para entregar genética de alta performance, potencializando a produtividade no campo e transformando cada cultivar em resultado real. Porque acreditamos que, ao lado de quem multiplica, distribui e planta, nasce **sua próxima geração de resultados**.

# ÍNDICE


SUL 6

**Lançamento** **7**

ST 655 I2X 7

ST 670 I2X 8

**Intacta 2 Xtend** **9**

ST 535 I2X **9**

ST 541 I2X **10**

ST 570 I2X **11**

ST 580 I2X **12**

ST 616 I2X **13**

ST 641 I2X **14**

**Intacta RR2 PRO** **15**

BS 2606 IPRO **15**

ST 622 IPRO **16**

**Round-up Ready** **17**

TECIRGA 6070 RR **17**

**Prática de Refúgio** **18**

**Mapa de Recomendação** **20**

REGIÃO

# SUL

# ST 655 I2X

LANÇAMENTO

**BSA65720I2X**

SoyTech®

**6.5** Grupo de maturação

**165g** Peso de mil grãos

- SANIDADE FOLIAR DIFERENCIADA
- SISTEMA RADICULAR AGRESSIVO
- ESTABILIDADE PRODUTIVA

**HÁBITO DE CRESCIMENTO:** Indeterminado
**PUBESCÊNCIA:** Cinza
**FLOR:** Roxa
**HILO:** Preto Imperfeito

| REAÇÃO A DOENÇAS | R | MR |
|---|---|---|
| **Nematoide de Cisto** | ○ | ○ |
| **Nematoide de Galha** | ○ | ○ |
| **Podridão R. de Fitóftora** (Rps1k) Raças: 1, 3, 4, 7 e 17 | ● | ○ |
| Cancro da Haste | ● | ○ |
| Necrose da Haste | ● | ○ |
| Mancha Alvo | ○ | ○ |
| Mancha Olho-de-Rã | ● | ○ |
| Pústula Bacteriana | ○ | ○ |
| Ferrugem Asiática | ○ | ○ |

## POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

| REC | REGIÃO | REF.MAPA PG. 32 | SET | | OUT | | | NOV | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 11-20 | 21-30 | 01-10 | 11-20 | 21-30 | 01-10 | 11-20 | 21-30 |
| 201 | Beira Lago | 10 | 240-260 | 240-260 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |
| 202 | Arenito | 13 | | | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 240-280 | 300-350 |
| 204 | Serra | 16 | | | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 240-280 | 300-350 |
| 201 / 203 | Norte PR / Sul SP | 12 | | | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 240-280 | 300-350 |

*Levar em consideração todas as janelas de vazio sanitário da sua região.

Recomendado  Tolerado

NÃO STS

INTACTA 2 XTEND

BASF
We create chemistry

# ST 670 I2X

LANÇAMENTO

BSA67785I2X

SoyTech®

**6.7** Grupo de maturação

**170g** Peso de mil grãos

- EXCELENTE POTENCIAL DE ENGALHAMENTO
- TOLERANTE AO ACAMAMENTO
- RESPONSIVA A ALTAS FERTILIDADES

**HÁBITO DE CRESCIMENTO:** Indeterminado
**PUBESCÊNCIA:** Cinza
**FLOR:** Branca
**HILO:** Marrom Claro

| REAÇÃO A DOENÇAS | R | MR |
|---|---|---|
| **Nematoide de Cisto** | ○ | ○ |
| **Nematoide de Galha** | ○ | ○ |
| **Podridão R. de Fitóftora** (Rps1k) Raças: 1, 3, 4, 7 e 17 | ● | ○ |
| Cancro da Haste | ● | ○ |
| Necrose da Haste | ● | ○ |
| Mancha Alvo | ○ | ○ |
| Mancha Olho-de-Rã | ○ | ○ |
| Pústula Bacteriana | ● | ○ |
| Ferrugem Asiática | ○ | ○ |

## POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

| REC | REGIÃO | REF.MAPA PG. 32 | OUT | | | NOV | | | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 01-10 | 11-20 | 21-30 | 01-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 |
| 202 | Arenito | 13 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 240-280 | 260-360 |
| 204 | Serra | 16 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 260-360 |
| 201 / 203 | Norte PR / Sul SP | 12 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 240-280 | 260-360 |

*Levar em consideração todas as janelas de vazio sanitário da sua região.

Recomendado  Tolerado

SIM STS

INTACTA 2 XTEND

BASF
We create chemistry

# ST 535 I2X

SoyTech®

**5.3** Grupo de maturação

**173g** Peso de mil grãos

- EXCELENTE POTENCIAL DE ENGALHAMENTO
- PRECOCIDADE
- NÃO É STS

**HÁBITO DE CRESCIMENTO:** Indeterminado
**PUBESCÊNCIA:** Cinza
**FLOR:** Roxa
**HILO:** Preto Imperfeito

| REAÇÃO A DOENÇAS | R | MR |
|---|---|---|
| **Nematoide de Cisto** | ○ | ○ |
| **Nematoide de Galha** | ○ | ○ |
| **Podridão R. de Fitóftora** (Rps1c) Raças: 1, 3, 7 e 17 | ● | ○ |
| Cancro da Haste | ● | ○ |
| Necrose da Haste | ● | ○ |
| Mancha Alvo | ○ | ○ |
| Mancha Olho-de-Rã | ○ | ○ |
| Pústula Bacteriana | ○ | ● |
| Ferrugem Asiática | ○ | ○ |

## POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

| REC | REGIÃO | REF.MAPA PG. 32 | SET | OUT | | | NOV | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21-30 | 01-10 | 11-20 | 21-30 | 01-10 | 11-20 | 21-30 |
| 102 | RS / SC Transição (>400 <650m) | 03 | | 280-300 | 300-320 | 300-320 | 300-320 | 300-320 | 320-340 |
| 102 | RS / SC (>650m) e PR (>500m) | 04 | 320-340 | 300-320 | 300-320 | 300-320 | 300-320 | 300-320 | 320-340 |
| 103 | Campos gerais (>750m) | 06 | | 310-330 | 300-320 | 300-320 | 300-320 | 300-320 | 320-340 |
| 103 | Campos Gerais (<750m) | 07 | | 310-330 | 300-320 | 300-320 | 300-320 | 300-320 | 320-360 |

*Levar em consideração todas as janelas de vazio sanitário da sua região.

Recomendado  Tolerado

NÃO STS

INTACTA 2 XTEND

BASF
We create chemistry

# ST 541 I2X

SoyTech®

**5.4** Grupo de maturação

**205g** Peso de mil grãos

- PERMITE ABERTURA DE PLANTIO
- AMPLA ADAPTAÇÃO GEOGRÁFICA
- TOLERANTE AO ACAMAMENTO

**HÁBITO DE CRESCIMENTO:** Indeterminado
**PUBESCÊNCIA:** Cinza
**FLOR:** Roxa
**HILO:** Preto Imperfeito

## POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

| REC | REGIÃO | REF.MAPA PG. 32 | SET | OUT | | | NOV | | | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21-30 | 01-10 | 11-20 | 21-30 | 01-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 |
| 101 | Coxilha | 01 | | 330-350 | 320-340 | 300-320 | 300-320 | 300-320 | 320-350 | 330-350 |
| 102 | RS / SC Transição (Entre 400 e 650m) | 03 | | 330-350 | 320-350 | 320-350 | 320-350 | 320-350 | 330-370 | |
| 102 | RS / SC (>650m) e PR (>500m) | 04 | 270-290 | 280-300 | 280-300 | 280-300 | 280-300 | 280-300 | 320-340 | |
| 103 | Campos Gerais (>750m) | 07 | | 280-300 | 280-300 | 280-300 | 280-300 | 280-300 | 280-370 | |
| 103 | Campos Gerais (<750m) | 06 | 280-320 | 260-300 | 260-300 | 260-300 | 260-300 | 260-300 | 280-370 | |
| 103 | Sudoeste SP | 08 | 340-360 | 300-320 | 300-320 | 300-320 | 300-320 | 320-360 | 320-360 | |
| 104 | Litoral SC | 09 | | | 320-340 | 280-300 | 280-300 | 280-300 | 300-320 | 320-340 |
| 201 | Transição PR | 11 | | 300-320 | 280-300 | 280-300 | 300-320 | 320-350 | 320-340 | |

*Levar em consideração todas as janelas de vazio sanitário da sua região.

Recomendado  Tolerado

| REAÇÃO A DOENÇAS | R | MR |
|---|---|---|
| **Nematoide de Cisto** | ○ | ○ |
| **Nematoide de Galha** | ○ | ○ |
| **Podridão R. de Fitóftora** (Rps1k) Raças: 1, 3, 4, 7 e 17 | ● | ○ |
| Cancro da Haste *D. aspalathi* | ● | ○ |
| Necrose da Haste | ● | ○ |
| Mancha Alvo | ○ | ○ |
| Mancha Olho-de-Rã | ○ | ○ |
| Pústula Bacteriana | ● | ○ |
| Ferrugem Asiática | ○ | ○ |

NÃO STS

INTACTA 2 XTEND

BASF
We create chemistry

# ST 570 I2X

**BSA57079I2X**

SoyTech®

**5.7** Grupo de maturação

**179g** Peso de mil grãos

- SANIDADE FOLIAR DIFERENCIADA
- AMPLA ADAPTAÇÃO GEOGRÁFICA
- ALTO POTENCIAL PRODUTIVO

**HÁBITO DE CRESCIMENTO:** Indeterminado
**PUBESCÊNCIA:** Cinza
**FLOR:** Roxa
**HILO:** Preto Imperfeito

| REAÇÃO A DOENÇAS | R | MR |
|---|---|---|
| **Nematoide de Cisto** | ○ | ○ |
| **Nematoide de Galha** | ○ | ○ |
| **Podridão R. de Fitóftora** (Rps1c) Raças: 1, 3, 7 e 17 | ● | ○ |
| Cancro da Haste | ● | ○ |
| Necrose da Haste | ● | ○ |
| Mancha Alvo | ○ | ○ |
| Mancha Olho-de-Rã | ○ | ○ |
| Pústula Bacteriana | ○ | ○ |
| Ferrugem Asiática | ○ | ○ |

## POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

| REC | REGIÃO | REF.MAPA PG. 32 | SET | OUT | | | NOV | | | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21-30 | 01-10 | 11-20 | 21-30 | 01-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 |
| 101 | Coxilha | 01 | | | | 220-240 | 220-240 | 230-250 | 240-260 | 260-350 |
| 101 | Várzea | 01 | | | | | 240-260 | 260-280 | 280-320 | 320-350 |
| 102 | RS / SC (< 400 m) | 02 | | | 250-270 | 240-260 | 240-260 | 240-260 | 250-260 | |
| 102 | RS / SC (> 650 m) e PR (> 500m) | 04 | | 200-220 | 200-240 | 200-240 | 220-240 | 220-240 | 240-280 | |
| 102 | RS / SC Transição (> 400< 650 m) | 03 | | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 240-260 | 240-260 | 240-260 | |
| 102 | Sudoeste PR | 05 | 240-280 | 230-260 | 230-260 | 230-260 | 230-260 | 230-260 | 240-300 | |
| 103 | Campos Gerais (> 750 m) | 06 | | 230-250 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 230-330 | |
| 103 | Campos Gerais (< 750 m) | 07 | | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 240-300 | |
| 103 | Sudoeste de SP | 08 | 240-280 | 220-260 | 220-260 | 220-260 | 220-260 | 220-260 | 230-350 | |
| 104 | Litoral SC | 09 | | | | 200-220 | 220-240 | 220-240 | 240-260 | 260-350 |
| 201 | Transição do PR | 11 | 250-280 | 240-260 | 240-260 | 240-260 | 240-260 | 240-260 | 250-350 | |

*Levar em consideração todas as janelas de vazio sanitário da sua região.

Recomendado  Tolerado

NÃO STS

INTACTA 2 XTEND

BASF
We create chemistry

# ST 580 I2X

SoyTech®

**5.8** Grupo de maturação

**210g** Peso de mil grãos

- ALTO POTENCIAL PRODUTIVO
- AMPLA ADAPTAÇÃO GEOGRÁFICA
- EXCELENTE POTENCIAL DE ENGALHAMENTO

**HÁBITO DE CRESCIMENTO:** Indeterminado
**PUBESCÊNCIA:** Cinza
**FLOR:** Roxa
**HILO:** Preto Imperfeito

| REAÇÃO A DOENÇAS | R | MR |
|---|---|---|
| **Nematoide de Cisto** | ○ | ○ |
| **Nematoide de Galha** | ○ | ○ |
| **Podridão R. de Fitóftora** (Rps1k) Raças: 1, 3, 4, 7 e 17 | ● | ○ |
| Cancro da Haste *D. aspalathi* | ● | ○ |
| Necrose da Haste | ● | ○ |
| Mancha Alvo | ○ | ○ |
| Mancha Olho-de-Rã | ● | ○ |
| Pústula Bacteriana | ○ | ○ |
| Ferrugem Asiática | ○ | ○ |

## POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

| REC | REGIÃO | REF.MAPA PG. 32 | SET | OUT | | | NOV | | | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21-30 | 01-10 | 11-20 | 21-30 | 01-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 |
| 101 | Coxilha | 01 | | | 250-280 | 230-260 | 220-240 | 220-240 | 230-260 | 250-330 |
| 102 | RS / SC (<400m) | 02 | | | 250-280 | 230-260 | 220-240 | 220-240 | 230-260 | 250-280 |
| 102 | RS / SC (>650m) e PR (>500m) | 04 | 230-260 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 230-260 | 230-330 |
| 102 | RS / SC Transição (Entre 400 e 650m) | 03 | | | 220-240 | 220-240 | 230-260 | 230-260 | 230-260 | 230-300 |
| 102 | Sudoeste PR | 05 | 230-260 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 230-260 | | |
| 103 | Campos gerais (<750m) | 07 | 230-260 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 230-300 | |
| 103 | Campos Gerais (>750m), Planalto Catarinense Campos de Cima da Serra RS | 06 | | 230-260 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 230-330 |
| 103 | Sudoeste SP | 08 | 230-260 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 230-350 | |
| 104 | Litoral SC | 09 | | | 260-300 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 230-260 |
| 201 | Transição PR (>600m) | 11 | 230-260 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 230-330 | |

*Levar em consideração todas as janelas de vazio sanitário da sua região.

Recomendado  Tolerado

NÃO STS

INTACTA 2 XTEND

BASF
We create chemistry

# ST 616 I2X

SoyTech®

## 6.1
Grupo de maturação

## 167g
Peso de mil grãos

- ALTO POTENCIAL PRODUTIVO
- AMPLA ADAPTAÇÃO GEOGRÁFICA
- ESTABILIDADE PRODUTIVA

**HÁBITO DE CRESCIMENTO:** Indeterminado
**PUBESCÊNCIA:** Cinza
**FLOR:** Roxa
**HILO:** Preto Imperfeito

| REAÇÃO A DOENÇAS | R | MR |
|---|---|---|
| **Nematoide de Cisto** | ○ | ○ |
| **Nematoide de Galha** | ○ | ○ |
| **Podridão R. de Fitóftora** (Rps1k) Raças: 1, 3, 4, 7 e 17 | ● | ○ |
| Cancro da Haste | ● | ○ |
| Necrose da Haste | ● | ○ |
| Mancha Alvo | ○ | ○ |
| Mancha Olho-de-Rã | ○ | ○ |
| Pústula Bacteriana | ○ | ○ |
| Ferrugem Asiática | ○ | ○ |

## POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

| REC | REGIÃO | REF.MAPA PG. 32 | SET | | | OUT | | | NOV | | | DEZ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 01-10 | 11-20 | 21-30 | 01-10 | 11-20 | 21-30 | 01-10 | 11-20 | 21-30 | 01-10 | 11-20 | 21-30 |
| 101 | Coxilha | 01 | | | | | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-260 | 240-260 | 260-280 | 280-320 | |
| 101 | Várzea | 01 | | | | | | | 220-240 | 220-260 | 260-300 | 280-300 | 280-340 | 300-360 |
| 102 | RS / SC (<400m) | 02 | | | | | 240-260 | 240-260 | 230-250 | 230-250 | 230-250 | 250-270 | | |
| 102 | RS / SC (>650m) e PR (>500m) | 04 | | | | 250-270 | 230-250 | 230-250 | 230-250 | 230-250 | 250-270 | | | |
| 102 | RS / SC Transição (>400<650m) | 03 | | | | | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 230-250 | 230-250 | 230-250 | | |
| 102 | Sudoeste PR | 05 | | | 240-260 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 240-260 | | | | |
| 103 | Campos Gerais (>750m) | 06 | | | | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 240-300 | | | |
| 103 | Campos Gerais (<750m) | 07 | | | | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-300 | 220-340 | | |
| 103 | Sudoeste SP | 08 | | 240-260 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 240-300 | | | |
| 104 | Litoral SC | 09 | | | | | 200-220 | 200-220 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 240-260 | 260-280 | |
| 201 | Beira Lago | 10 | 260-280 | 240-260 | 220-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 240-260 | | | | | |
| 201 | Transição PR | 11 | 240-260 | 240-260 | 220-260 | 180-260 | 180-260 | 180-260 | 200-260 | | | | | |
| 201/ 203 | Norte PR / Sul SP | 12 | | | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-320 | | | | |
| 202 | Arenito | 13 | | | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | | | | |
| 204 | Grande Dourados | 14 | | | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | | | | |
| 204 | Fronteira | 15 | | | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-340 | | | | |
| 204 | Serra | 16 | | | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | 220-280 | | | | |
| 302 | SP Baixa Altitude | 21 | | | | | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-320 | | | |
| 303 | Sul de Minas | 23 | | | | | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 240-300 | | | |
| 405 | Bahia | 34 | | | | 380-420 | 380-420 | | | | | | | |

*Levar em consideração todas as janelas de vazio sanitário da sua região.

Recomendado  Tolerado

NÃO STS

INTACTA 2 XTEND

BASF
We create chemistry

# ST 641 I2X

SoyTech®

**6.4** Grupo de maturação

**176g** Peso de mil grãos

- ALTO POTENCIAL PRODUTIVO
- SISTEMA RADICULAR AGRESSIVO
- EXCELENTE POTENCIAL DE ENGALHAMENTO

**HÁBITO DE CRESCIMENTO:** Indeterminado
**PUBESCÊNCIA:** Cinza
**FLOR:** Roxa
**HILO:** Preto Imperfeito

| REAÇÃO A DOENÇAS | R | MR |
|---|---|---|
| **Nematoide de Cisto** | ○ | ○ |
| **Nematoide de Galha** | ○ | ○ |
| **Podridão R. de Fitóftora** (Rps1k) Raças: 1, 3, 4, 7 e 17 | ● | ○ |
| Cancro da Haste *D. aspalathi* | ● | ○ |
| Necrose da Haste | ● | ○ |
| Mancha Alvo | ○ | ○ |
| Mancha Olho-de-Rã | ○ | ● |
| Pústula Bacteriana | ● | ○ |
| Ferrugem Asiática | ○ | ○ |

## POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

| REC | REGIÃO | REF.MAPA PG. 32 | SET | OUT | | | NOV | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21-30 | 01-10 | 11-20 | 21-30 | 01-10 | 11-20 | 21-30 |
| 201 / 203 | Norte PR / Sul SP | 12 | 200-240 | 200-240 | 200-240 | 200-240 | 200-240 | 200-300 | |
| 204 | Grande Dourados | 14 | 200-240 | 200-240 | 200-240 | 200-240 | 200-240 | 200-240 | |
| 202 | Arenito | 13 | 200-240 | 200-240 | 200-240 | 200-240 | 200-240 | 200-240 | 200-330 |
| 204 | Fronteira | 15 | 200-240 | 200-240 | 200-240 | 200-240 | 200-240 | 200-300 | |
| 204 | Serra | 18 | 200-240 | 200-240 | 200-240 | 200-240 | 200-240 | 200-240 | |
| 301 | Chapadões | 18 | | 330-350 | 310-330 | 310-330 | 310-330 | 310-330 | 330-390 |
| 301 | MS Norte | 17 | | 330-350 | 310-330 | 310-330 | 310-330 | 310-330 | 310-390 |
| 301 / 401 | Sudoeste GO | 19 | | 330-370 | 330-350 | 330-350 | 330-350 | 330-350 | 330-400 |
| 303 | Triângulo MG | 22 | | 290-310 | 270-300 | 270-300 | 270-300 | 270-300 | 270-350 |
| 302 / 303 | Pontal MG / Sul GO | 20 | | 350-370 | 330-350 | 330-350 | 330-350 | 330-350 | 350-400 |
| 302 | SP Baixa Altitude | 21 | | 280-300 | 250-270 | 250-270 | 250-270 | 250-270 | 250-340 |
| 304 | GO / MG | 24 | | | 360-400 | 340-360 | 340-360 | 340-360 | 340-440 |
| 304 | GO / MG (Irrigado) | 24 | 330-350 | 330-350 | 330-350 | 330-350 | 320-340 | 320-340 | 320-340 |
| 404 | Norte GO | 31 | | | 380-400 | 360-380 | 360-380 | 360-380 | 360-440 |

*Levar em consideração todas as janelas de vazio sanitário da sua região.

Recomendado  Tolerado

NÃO STS

INTACTA 2 XTEND

BASF
We create chemistry

# BS 2606 IPRO

SoyTech®

**6.0** Grupo de maturação

**173g** Peso de mil grãos

- SISTEMA RADICULAR AGRESSIVO
- EXCELENTE POTENCIAL DE ENGALHAMENTO
- AMPLA ADAPTAÇÃO GEOGRÁFICA

**HÁBITO DE CRESCIMENTO:** Indeterminado
**PUBESCÊNCIA:** Cinza
**FLOR:** Roxa
**HILO:** Preto Imperfeito

| REAÇÃO A DOENÇAS | R | MR |
|---|---|---|
| **Nematoide de Cisto** | ○ | ○ |
| **Nematoide de Galha** | ○ | ○ |
| **Podridão R. de Fitóftora** (Rps1c) Raças: 1, 3 , 7 e 17 | ● | ○ |
| Cancro da Haste *D. aspalathi* | ○ | ● |
| Necrose da Haste | ● | ○ |
| Mancha Alvo | ○ | ○ |
| Mancha Olho-de-Rã | ○ | ● |
| Pústula Bacteriana | ● | ○ |
| Ferrugem Asiática | ○ | ○ |

## POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

| REC | REGIÃO | REF.MAPA PG. 32 | SET | | OUT | | | NOV | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 11-20 | 21-30 | 01-10 | 11-20 | 21-30 | 01-10 | 11-20 | 21-30 |
| 101 | Coxilha | 01 | | | | 260-280 | 240-260 | 240-260 | 240-260 | 240-260 |
| 102 | RS / SC (<400m) | 02 | | | 280-300 | 260-280 | 260-280 | 220-240 | 220-240 | 280-300 |
| 102 | RS / SC (>650m) e PR (>500m) | 04 | | 260-280 | 240-260 | 220-240 | 200-220 | 200-220 | 220-240 | 240-260 |
| 102 | RS / SC Transição (>400 <650m) | 03 | | | 260-280 | 240-260 | 220-240 | 220-240 | 240-260 | 260-280 |
| 102 | Sudoeste PR | 05 | | 280-300 | 240-260 | 220-240 | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 240-260 |
| 103 | Campos Gerais < 750m | 07 | | | 260-280 | 240-260 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 240-260 |
| 103 | Campos Gerais (>750m), Planalto Catarinense e Campos de Cima da Serra RS | 06 | | | 240-260 | 240-260 | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 240-260 |
| 201 | Beira Lago | 10 | 280-300 | 260-280 | 260-280 | 220-240 | 220-240 | | | |
| 201 | Transição PR | 11 | 260-280 | 240-260 | 240-260 | 200-220 | 200-220 | 200-220 | | |
| 202 | Arenito | 13 | | 280-300 | 260-280 | 260-280 | 260-280 | 260-280 | 260-280 | |
| 204 | Fronteira | 15 | | 260-280 | 240-260 | 240-260 | 240-260 | 240-260 | | |
| 204 | Grande Dourados | 14 | | 280-300 | 260-280 | 260-280 | 260-280 | 260-280 | | |
| 204 | Serra | 16 | | 280-300 | 260-280 | 260-280 | 260-280 | 260-280 | 260-280 | |
| 201 / 203 | Norte PR / Sul SP | 12 | | 260-280 | 240-260 | 240-260 | 240-260 | 240-260 | 240-260 | 260-280 |
| 301 | Chapadões | 18 | | | 400-420 | 380-400 | 380-400 | 380-400 | 380-400 | |
| 302 | SP Baixa Altitude | 21 | | | 380-400 | 360-380 | 360-380 | 360-380 | 360-380 | 380-400 |
| 303 | Triângulo MG | 22 | | | 400-420 | 380-400 | 380-400 | 380-400 | 380-400 | 400-420 |
| 304 | GO / MG | 24 | | | 400-420 | 380-400 | 380-400 | 380-400 | 380-400 | 400-420 |
| 301 / 401 | Sudoeste GO | 19 | | | 400-420 | 380-400 | 380-400 | 380-400 | 380-400 | 400-420 |
| 302 / 303 | Pontal Sul GO | 20 | | | 400-420 | 380-400 | 380-400 | 380-400 | 380-400 | 400-420 |

*Levar em consideração todas as janelas de vazio sanitário da sua região.

Recomendado  Tolerado

SIM STS

INTACTA RR2 PRO®

BASF
We create chemistry

# ST 622 IPRO

SoyTech®

**6.2** Grupo de maturação

**173g** Peso de mil grãos

- ALTO POTENCIAL PRODUTIVO
- AMPLA ADAPTAÇÃO GEOGRÁFICA
- TOLERANTE AO ACAMAMENTO

**HÁBITO DE CRESCIMENTO:** Indeterminado
**PUBESCÊNCIA:** Cinza
**FLOR:** Roxa
**HILO:** Preto Imperfeito

| REAÇÃO A DOENÇAS | R | MR |
|---|---|---|
| **Nematoide de Cisto** | ○ | ○ |
| **Nematoide de Galha** | ○ | ○ |
| **Podridão R. de Fitóftora** | ○ | ● |
| Cancro da Haste *D. aspalathi* | ● | ○ |
| Necrose da Haste | ● | ○ |
| Mancha Alvo | ○ | ○ |
| Mancha Olho-de-Rã | ○ | ○ |
| Pústula Bacteriana | ○ | ○ |
| Ferrugem Asiática | ○ | ○ |

## POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

| REC | REGIÃO | REF.MAPA PG. 32 | SET | | OUT | | | NOV | | | DEZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 11-20 | 21-30 | 01-10 | 11-20 | 21-30 | 01-10 | 11-20 | 21-30 | 01-10 | 11-20 |
| 101 | Várzea | 01 | | | | | | 280-300 | 280-300 | 280-300 | 300-320 | 320-360 |
| 101 | Coxilha | 01 | | | | | 280-300 | 280-300 | 280-300 | 280-300 | 300-320 | 320-360 |
| 102 | RS / SC Transição (Entre 400 e 650m) | 03 | | | | | 240-260 | 240-260 | 240-260 | 240-260 | 260-280 | 260-280 |
| 102 | RS / SC (<400m) | 02 | | | | | 280-320 | 260-280 | 260-280 | 260-280 | 280-320 | |
| 102 | Sudoeste PR | 05 | 260-280 | 260-280 | 260-280 | 220-240 | 220-240 | | | | | |
| 103 | Campos gerais (>750m), Planalto Catarinense e Campos de Cima da Serra RS | 06 | | 260-300 | 240-260 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 260-280 | 260-300 | |
| 103 | Campos Gerais (<750m) | 07 | | 260-300 | 240-260 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 260-280 | 260-300 | |
| 103 | Sudoeste SP | 08 | 280-320 | 220-240 | 240-260 | 220-240 | 220-240 | 240-260 | 240-260 | | | |
| 104 | Litoral SC | 09 | | | | | | 260-280 | 260-280 | 260-280 | 260-280 | 280-320 |
| 201 | Beira Lago | 10 | | 260-300 | 240-260 | 240-260 | 240-260 | 260-300 | | | | |
| 201 | Transição PR (<600m) | 11 | | 260-300 | 240-260 | 240-260 | 240-260 | 260-300 | | | | |
| 201 | Transição PR (>600m) | 11 | | 240-260 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 240-260 | | | | |
| 201 / 203 | Norte PR / Sul SP (<500m) | 12 | | 260-300 | 240-260 | 240-260 | 240-260 | 240-260 | 240-260 | | | |
| 201 / 203 | Norte PR / Sul SP (>500m) | 12 | | | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | | | |
| 202 | Arenito (PR) | 13 | | | 260-300 | 260-280 | 260-280 | 260-280 | 260-300 | | | |
| 202 | Arenito (MS) | 13 | | | 280-320 | 260-280 | 240-260 | 240-260 | 260-300 | | | |
| 204 | Grande Dourados | 14 | | | 260-300 | 260-280 | 240-260 | 240-260 | 260-300 | | | |
| 204 | Fronteira | 15 | | 280-320 | 260-280 | 240-260 | 240-260 | 240-260 | 260-300 | | | |
| 204 | Serra | 16 | | 280-320 | 260-280 | 260-280 | 260-280 | 260-280 | 260-300 | | | |
| 302 | SP Baixa Altitude | 21 | | | 270-310 | 250-270 | 250-270 | 250-270 | 250-270 | | | |
| 303 | Triângulo MG / Sudeste GO | 22 | | | 350-390 | 330-350 | 330-350 | 330-350 | 350-390 | | | |
| 304 | GO / MG | 24 | | | 400-440 | 380-300 | 330-300 | 360-380 | 360-380 | 360-380 | | |

*Levar em consideração todas as janelas de vazio sanitário da sua região.

Recomendado  Tolerado

NÃO STS

INTACTA RR2 PRO®

BASF
We create chemistry

# TECIRGA 6070 RR

SoyTech®

**6.3** Grupo de maturação

**145g** Peso de mil grãos

- SANIDADE FOLIAR DIFERENCIADA
- ADAPTADO A ÁREAS DE VÁRZEA
- SISTEMA RADICULAR AGRESSIVO

**HÁBITO DE CRESCIMENTO:** Indeterminado
**PUBESCÊNCIA:** Cinza claro
**FLOR:** Branca
**HILO:** Marrom Claro

| REAÇÃO A DOENÇAS | R | MR |
|---|---|---|
| **Nematoide de Cisto** | ○ | ○ |
| **Nematoide de Galha** | ○ | ○ |
| **Podridão R. de Fitóftora** (Rps1c) Raças: 1, 3 , 7 e 17 | ● | ○ |
| Cancro da Haste *D. aspalathi* | ● | ○ |
| Necrose da Haste | ● | ○ |
| Mancha Alvo | ○ | ○ |
| Mancha Olho-de-Rã | ● | ○ |
| Pústula Bacteriana | ● | ○ |
| Ferrugem Asiática | ○ | ○ |

## POPULAÇÃO POR ÉPOCA DE PLANTIO (MIL PLANTAS/HA) NAS REGIÕES RECOMENDADAS*

| REC | REGIÃO | REF.MAPA PG. 32 | OUT | | | NOV | | | DEZ | | | JAN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 01-10 | 11-20 | 21-30 | 01-10 | 11-20 | 21-30 | 01-10 | 11-20 | 21-30 | 01-10 | 11-20 | 21-30 |
| 101 | Várzea | 01 | 300-320 | 280-300 | 280-300 | 280-300 | 280-300 | 300-320 | 300-320 | 320-340 | 360-380 | 360-380 | 360-380 | 360-380 |
| 104 | Litoral SC | 09 | | | 280-300 | 260-280 | 260-280 | 260-280 | 280-300 | 300-320 | 320-340 | 340-360 | | |

*Levar em consideração todas as janelas de vazio sanitário da sua região.

Recomendado  Tolerado

NÃO STS

Roundup Ready SOJA

BASF
We create chemistry

# EXEMPLIFICAÇÃO DA **PRÁTICA DE REFÚGIO**

SoyTech®

## O QUE É O REFÚGIO?

Soja BT: é a soja que teve seu código geneticamente modificado, recebendo proteína BT.

A soja não BT: é a variedade que não possui a proteína BT.

Serve para gerar indivíduos suscetíveis às proteínas BT > elas poderão cruzar com indivíduos sobreviventes do talhão com soja Bt e assim preservar a biotecnologia.

Para que o refúgio seja efetivo, as sementes BT devem ser plantadas em 80% da área total de soja e 20% de sementes não BT, respeitando uma distância máxima de 800 metros das áreas com soja INTACTA. Essa prática auxilia em retardar a multiplicação de insetos resistentes à tecnologia.







**BLOCO OU PIVÔ CENTRAL DE IRRIGAÇÃO**

Pivô central onde 20% foram semeados com cultivar não BT e o restante com cultivar BT.







**BORDADURA OU PERÍMETRO**

Na bordadura da lavoura, foi realizada a semeadura com cultivar não BT, respeitando o mínimo de 20% da propriedade. E no centro temos uma cultivar com BT, respeitando o mínimo orientado de 80%.




**TALHÃO**

Nos dois talhões mais escuros foi realizada semeadura com cultivar não BT. Já nos demais talhões, em cinza claro, a semeadura foi feita com cultivares IPRO e I2X, ambas com presença de BT.

ÁREA NÃO BT  ÁREA BT

# MAPA DE RECOMENDAÇÃO

SoyTech®

| REC | REGIÃO | Nº |
|---|---|---|
| 101 | Coxilha | 01 |
| 101 | Várzea | 01 |
| 102 | RS / SC (<400m) | 02 |
| 102 | RS / SC Transição (Entre 400 e 650m) | 03 |
| 102 | RS / SC (>650m) e PR (>500m) | 04 |
| 102 | Sudoeste PR | 05 |
| 103 | Campos Gerais (>750m), Planalto Catarinense e Campos de Cima da serra RS | 06 |
| 103 | Campos Gerais (<750m) | 07 |
| 103 | Sudoeste SP | 08 |
| 104 | Litoral SC | 09 |
| 201 | Beira Lago | 10 |
| 201 | Transição PR | 11 |
| 201 / 203 | Norte PR / Sul SP | 12 |
| 202 | Arenito | 13 |
| 204 | Grande Dourados | 14 |
| 204 | Fronteira | 15 |
| 204 | Serra | 16 |
| 301 | MS Norte | 17 |
| 301 | Chapadões | 18 |
| 301 / 401 | Sudoeste GO | 19 |
| 302 / 303 | Pontal MG / Sul GO | 20 |
| 302 | SP Baixa Altitude | 21 |
| 303 | Triângulo MG /Sudeste GO | 22 |
| 303 | Sul de Minas | 23 |
| 304 | GO / MG | 24 |
| 401 | MT Sul | 25 |
| 401 | Grande Primavera | 26 |
| 402 | Parecis | 27 |
| 402 | BR 163 | 28 |
| 402 | Rondônia | 29 |
| 403 | Vale do Araguaia | 30 |
| 404 | Norte GO | 31 |
| 404 | TO Sul | 32 |
| 501 | Norte TO / Sul PA | 33 |
| 405 | Bahia | 34 |
| 501 | MA / PI | 35 |
| 502 | Norte PA / MA | 36 |



# SoyTech®

SUA PRÓXIMA GERAÇÃO
DE **RESULTADOS**

**BASF Soluções para Agricultura.**
**Juntos pelo seu Legado.**

BASF
We create chemistry